

Dermatite da allergia alle pulci (DAP)

Generalita'

La Dap e' una malattia cutanea molto frequente sia nel cane che nel gatto causata da un'ipersensibilita' dell'animale alle punture delle pulci e piu'nello specifico alla loro saliva che funge da allergene. Una volta che si e' stabilita l'allergia è sufficiente la puntura di una sola pulce per sostenerla. La presenza della patologia anche nella stagione invernale e' dovuta alla permanenza dei nostri amici animali in appartamenti riscaldati dove il ciclo vitale della pulce puo' facilmente perpetuare.



Manifestazioni cliniche

Il sintomo principale e' il prurito con lesioni concentrate nella parte posteriore del dorso, alla base della coda e nella porzione posteriore della coscia .L'animale e' spesso irrequieto e tende a mordicchiare le zone suddette causando alopecia.E' visibile inoltre pelo spezzato.Oltre al prurito è evidente una dermatite con croste ,scaglie, papule e seborrea secondaria.



Diagnosi

L' anamnesi, la presenza di pulci e loro deiezioni e la distribuzione tipica delle lesioni sono importanti ausili diagnostici. Come diagnosi differenziali nel gatto vanno considerate la cheyletiellosi, allergia alimentare, dermatofitosi, follicoliti.

Terapia

Si basa essenzialmente su un programma di controllo delle pulci e sull'attuazione di una terapia sintomatica nei confronti del prurito e delle superinfezioni batteriche secondarie che possono instaurarsi a livello cutaneo.